



## MONITORAGGIO DEGLI ADULTI

Da febbraio a novembre è utile effettuare un monitoraggio con bottiglie trappola (es. con tappo TAP-TRAP) riempite con circa 500mL di birra chiara (4,7°) come esca attrattiva. Le trappole vanno posizionate nei dintorni dell'apiario o in zone verdi ad altezza di 1,5-1,8 metri da terra.

Le trappole vanno svuotate per controllare il contenuto e per sostituire l'esca ogni 10-15 giorni.

Ulteriori informazioni sul sito  
[www.apicoltorireggioparma.it](http://www.apicoltorireggioparma.it)

### COSA NON FARE

Non cercare mai di avvicinarsi per osservare o distruggere i nidi. Le velutine, se infastidite, possono diventare aggressive e procurare lesioni anche mortali con la loro puntura.

Limitarsi sempre alla sola segnalazione di adulti e nidi sospetti.

### COSA FARE

**Gli apicoltori** possono verificare periodicamente il contenuto delle trappole e segnalare casi sospetti ai numeri riportati di seguito.

Verificare l'eventuale presenza di operaie di velutina in volo stazionario di fronte agli alveari.

**Ogni cittadino** può segnalare nidi primari o secondati sospetti mandando una foto. È importante la tempestività.

### CONTATTI E NUMERI UTILI

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI:

[www.stopvelutina.it](http://www.stopvelutina.it)

Associazione Apicoltori Reggio Parma  
tel. 0522 / 922353 mail: [prapire@libero.it](mailto:prapire@libero.it)

Referente monitoraggio velutina zona di Parma:  
Enrico 338 / 8551721

Referente monitoraggio velutina  
zona di Reggio Emilia:  
Enrico 328 / 6425105

Referente monitoraggio velutina  
zona di Modena:  
Giuseppe 348 / 2559696



# VESPA

# VELUTINA

## OPUSCOLO INFORMATIVO

## COME RICONOSCERLA, COSA FARE IN CASO DI AVVISTAMENTO



Cofinanziato  
dall'Unione europea